



康護寧[®]

消炎噴液劑1.5毫克/毫升 衛署藥製字第045922號
Comfflam Anti-inflammatory Spray 1.5mg/ml

【有效成分及含量】 Benzydamine hydrochloride 1.5毫克/毫升

【其他成分(賦形劑)】 Tween 80、Brilliant blue FCF、Glycerin、Tartrazine、Methyl paraben、Propyl paraben、Peppermint oil、Clove oil、Alcohol。

【用途(適應症)】 舒解口腔及咽喉疼痛，包括下列疾病或症狀引起的疼痛：扁桃腺炎、喉嚨痛、放射治療引起的黏膜炎、鵝口瘡潰瘍、口腔與牙周手術後疼痛。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情況者，請勿使用：曾經因本類藥物引起過敏症狀者。
- 二、有下列情況者，請洽醫師診治：(一) 6歲以下兒童。(二) 有肝腎疾病的人。
- 三、有下列情況者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 - (一) 孕婦，可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - (二) 正在使用其他藥品者(包含非處方藥)。雖然目前尚無已知與其有交互作用之藥品。
- 四、其它使用上注意事項：
 - (一) 勿超過建議用量。
 - (二) 為防止兒童誤食請妥善保管。
 - (三) 使用時請勿接近眼睛，若不小心接觸到眼睛，請立即以大量清水清洗。
 - (四) 連續使用不應超過7天。

【用法用量】

成人及12歲以上兒童	噴液劑每次噴4~8下，直接噴於疼痛及發炎部位。需要時，可每1.5~3小時使用一次
6歲至12歲兒童	噴液劑每次噴4下，直接噴於疼痛及發炎部位。需要時，可每1.5~3小時使用一次。
6歲以下兒童	請洽醫師診治

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

身體部位	副作用
消化系統	麻木、灼熱、刺痛、口乾或口渴、噁心、嘔吐、胃腸不適
神經系統	頭昏、頭痛、嗜睡。

二、服用本藥後，若有以下症狀時，請立即停用，並接受醫師診治：

- (一) 全身過敏性反應，如皮膚癢疹，蕁麻疹，光過敏性皮膚炎，呼吸困難，喉嚨痙攣，支氣管痙攣。
- (二) 若有上述外之其他不適情況產生。
- (三) 自覺狀況沒有改善或更惡化。

【包裝】 100毫升以下之玻璃瓶裝

【類別】 醫師藥師藥劑生指示藥品

【儲存】 25℃以下儲存



製造廠：旭能醫藥生技股份有限公司
苗栗縣竹南鎮科研路25號

委託者：BEST PHARMA Co., Ltd.
倍斯特醫藥生物科技股份有限公司

總公司：台中市北屯區崇德路二段51號3樓之3、之5